

Bases Matemáticas - Lista 4 B

Funções - Parte 1

Conceitos Básicos e Generalidades

1 — Sejam dados A e B conjuntos não vazios.

- Defina rigorosamente o conceito de função de A em B .
- Defina rigorosamente os conceitos de função injetora, sobrejetora e bijetora.

2 — Dados os conjuntos $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, diga quais das relações abaixo definem uma função $f : A \rightarrow B$. Para cada uma destas, diga se é injetora, sobrejetora ou bijetora.

- $R = \{(e, 1), (o, 2)\}$
- $R = \{(a, 1), (e, 1), (i, 1), (o, 2), (u, 2)\}$
- $R = \{(a, 1), (e, 2), (i, 3), (o, 4), (u, 5)\}$
- $R = \{(a, 1), (e, 1), (e, 2), (i, 1), (u, 2), (u, 5)\}$
- $R = \{(a, 3), (e, 3), (i, 3), (o, 3), (u, 3)\}$
- $R = \{(a, 1), (e, 3), (i, 3), (o, 2), (u, 2)\}$
- $R = \{(a, 2), (e, 1), (i, 4), (o, 5), (u, 3)\}$

3 — Determine o domínio maximal $D \subset \mathbb{R}$ das seguintes funções $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

- $f(x) = \frac{1}{x(x+4)(3x+1)}$
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x(x^2-4)}}$
- $f(x) = \sqrt{\sqrt{1+x} - x}$
- $f(x) = \sqrt{|1+x| - |x^2|}$
- $f(x) = \sqrt[3]{1 - \sqrt{|x|} - 3}$

4 — Determine o domínio maximal $D \subset \mathbb{N}$ das seguintes funções $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

- $f(n) = \frac{1}{n(n+4)(3n+1)}$
- $f(n) = \sqrt{|1+n| - |n^2|}$

5 — Para cada uma das seguintes funções, determine se são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, justificando (i.e. provando ou dando contra-exemplos)

- Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $f : A \rightarrow A$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \text{ é ímpar} \\ \frac{x}{2}, & \text{se } x \text{ é par} \end{cases}$$

- Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $f : A \rightarrow A$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{se } x \neq 7 \\ 1, & \text{se } x = 7 \end{cases}$$

- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = 3n + 1.$
- $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(n) = n - |n|.$
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ com $a \neq 0.$
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^2 .$
- $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}.$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}.$
- $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}.$

6 — Determine o conjunto imagem da função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(n) = (-1)^n n.$

7 — Considerando a função f do Exercício 6, determine o conjunto imagem da função $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $g(n) = f(n) + f(n+1).$

8 — Sejam dadas as seguintes funções

- (a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = 3n + 1$
- (b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x - |(x + 2)^2 - 1|$
- (c) $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \sqrt{x + 1} - \sqrt{x}$

Determine as pré-imagens abaixo

- a) $f^{-1}(\{2\})$.
- b) $f^{-1}(\{2k \mid k \in \mathbb{N}\})$.
- c) $g^{-1}(\{-1\})$.
- d) $g^{-1}([-3, -1])$.
- e) $h^{-1}(\{1\})$.
- f) $h^{-1}([\frac{1}{3}, \frac{1}{2}])$

Exercícios Complementares

9 — Para cada uma das seguintes funções, determine se são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, justificando (i.e. provando ou dando contra-exemplos)

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, f(x) = (x, x)$.
- b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, f(x) = (x, |x|)$.
- c) $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x - |y|$.
- d) $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, f(x, y) = (x, y^3)$.

10 — Seja dada uma função $f : A \rightarrow B$. Se X e Y são subconjuntos do domínio A e se V e W são subconjuntos do contradomínio B , mostre que

- a) Se $X \subset Y$ então $f(X) \subset f(Y)$.
- b) Se $V \subset W$ então $f^{-1}(V) \subset f^{-1}(W)$.
- c) $X \subset f^{-1}(f(X))$.
- d) Se f é injetora então $X = f^{-1}(f(X))$.

11 — Com os mesmos dados do Exercício 10, mostre que

- a) $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$.
- b) $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.
- c) Se f é injetora então $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$.

- d) $f^{-1}(V \cup W) = f^{-1}(V) \cup f^{-1}(W)$.
- e) $f^{-1}(V \cap W) = f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$.

12 — Considere a função $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = y - |x|$.

- a) Calcule $f^{-1}(\{0\})$
- b) Calcule $f^{-1}((0, \infty))$

* 13 — Seja A um conjunto (não vazio) com n elementos e seja B um conjunto qualquer. Mostre cada uma das seguintes afirmações:

- a) Se existe uma função injetora $f : A \rightarrow B$, então B possui *pelo menos* n elementos.
- b) Se existe uma função sobrejetora $f : A \rightarrow B$, então B possui *no máximo* n elementos.
- c) Conclua, das afirmações acima, a seguinte propriedade: dois conjuntos finitos possuem o mesmo número de elementos se, e somente se, existe uma função bijetora entre tais conjuntos.

Respostas dos Exercícios

1 a.) Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma relação entre os conjuntos A e B , de modo que a cada elemento $x \in A$ corresponde um único elemento $y \in B$.

2 c.) É função, bijetora;

d.) Não é função;

f.) É função, nem injetora, nem sobrejetora;

3 c.) $D = (-2, 0) \cup (2, +\infty)$;

d.) $D = \left[-1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$;

f.) $D = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$

4 a.) $D = \mathbb{N}^*$;

b.) $D = \{0, 1\}$

5 a.) Nada;

b.) Bijetora;

c.) A função é injetora pois

$$f(n') = f(n) \Rightarrow 3n' + 1 = 3n + 1 \Rightarrow n = n'$$

Entretanto não é sobrejetora pois 5 pertence ao contradomínio, mas não existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f(n) = 5$, pois $3n + 1 = 5 \Rightarrow 3n = 4$ e claramente não existe nenhum natural com essa propriedade.

d.) Nada;

e.) A função é injetora pois

$$f(x') = f(x) \Rightarrow ax + b = ax' + b \Rightarrow ax' = ax$$

e como $a \neq 0$, temos que $x = x'$. A função é sobrejetora pois dado $y \in \mathbb{R}$

$$f(x) = y \Leftrightarrow ax + b = y \Leftrightarrow x = \frac{y - b}{a}$$

ou seja, $f\left(\frac{y-b}{a}\right) = y$.

f.) Nada;

g.) Injetora;

h.) Nada;

i.) Injetora;

6 $\text{Im } f = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{-(2n + 1) \mid n \in \mathbb{N}\}$

7 $\text{Im } f = \{-1, 1\}$

8 a.) \emptyset

b.) $\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é ímpar e múltiplo de } 3\}$

c.) $\{-1\}$

d.) $[-3, 0]$

e.) $\{0\}$

f.) $\left[\frac{9}{16}, \frac{16}{9}\right]$

9 a.) A função não é sobrejetora, pois $(1, 0)$ pertence ao contradomínio mas não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = (1, 0)$. A função é injetora, pois $f(x) = f(x') \Rightarrow (x, x) = (x', x') \Rightarrow x = x'$

b.) Injetora;

c.) Sobrejetora. A função não é injetora pois $f((0, 1)) = 1 = f((0, -1))$.

d.) Bijetora

11 a.) Se $X \cup Y = \emptyset$, a afirmação é trivial. Caso contrário, seja $a \in f(X \cup Y)$. Então existe $b \in X \cup Y$ tal que $f(b) = a$. Como $b \in X$ ou $b \in Y$, então $a \in f(X)$ ou $a \in f(Y)$. Assim $f(X \cup Y) \subset f(X) \cup f(Y)$. Por outro lado, se $a \in f(X) \cup f(Y)$, então existe $b \in X$ ou $b \in Y$ tal que $f(b) = a$. Em qualquer um dos casos, existe $b \in X \cup Y$ tal que $f(b) = a$. Logo, $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$.

c.) A inclusão $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$ é objeto do item (b). Mostremos somente a inclusão $f(X) \cap f(Y) \subset f(X \cap Y)$. Se $f(X) \cap f(Y) = \emptyset$, a inclusão é trivial. Senão, seja dado $a \in f(X) \cap f(Y)$. Então existem $b \in X$ e $c \in Y$ tais que $f(b) = a$ e $f(c) = a$. Como a função f é injetora (hipótese do exercício), deve resultar $b = c$. Assim, $b \in X \cap Y$ e portanto $a \in f(X \cap Y)$.

e.) Se $V \cap W = \emptyset$, então a inclusão $f^{-1}(V \cap W) \subset f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$ é trivial. Senão, seja $x \in f^{-1}(V \cap W)$. Como $f(x) \in V \cap W$, então $f(x) \in V$ e $f(x) \in W$, e assim resulta $x \in f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$. Logo, vale $f^{-1}(V \cap W) \subset f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$. Vice-versa, se $f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W) = \emptyset$, a inclusão $f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W) \subset f^{-1}(V \cap W)$ é trivial. Senão, seja $x \in f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$. Então $f(x) \in V$ e $f(x) \in W$, ou seja, $f(x) \in V \cap W$. Logo, $x \in f^{-1}(V \cap W)$, o que prova a inclusão $f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W) \subset f^{-1}(V \cap W)$.

12 a.) $\{(x, |x|) \mid x \in \mathbb{R}\}$

b.) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > |x|\}$

13 No que se segue, denotaremos o número de elementos de um conjunto X por $|X|$. Antes de considerar cada caso, observemos que, dados dois conjuntos quaisquer X, Y , com $|X| = n$, tem-se que:

1. Se $X \subset Y$, então Y possui pelo menos n elementos (uma vez que os n elementos de X estão em Y)
2. Se $Y \subset X$, então Y possui no máximo n elementos (pois não poderia ter elementos que não estão em X)

Além disso, na notação do enunciado, tem-se sempre que:

3. $f(A) \subset B$ (pela definição de função)
 4. $|f(A)| \leq n$ (pois os n elementos de A geram, no máximo, n imagens distintas)
- a.)** Se f é injetora, então os n elementos de A geram n imagens distintas, i.e., $|f(A)| = n$. Pelas observações 1 e 3 acima, B possui ao menos n elementos.
- b.)** Se f é sobrejetora, então $B = f(A)$, em particular, $B \subset f(A)$. Pelas observações 2 e 4 acima, B possui no máximo n elementos.