

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

## Lista 8

### Funções de Uma Variável

#### Técnicas de Integração

**1** — Determine  $\alpha$  e  $\beta$  de modo que:

$$\sin(6x) \cos(4x) = \frac{1}{2} (\sin(\alpha x) + \sin(\beta x)).$$

**Dica:** use que:  $\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$

**6** — Usando o exercício anterior calcule as seguintes integrais:

**2** — Usando a técnica do exercício anterior calcule:

- a)  $\int \sin(6x) \cos(x) dx$
- b)  $\int \sin(x) \cos(6x) dx$
- c)  $\int_0^{\pi/3} \sin(3x) \cos(2x) dx$
- d)  $\int \sin(mx) \cos(nx) dx$

**3** — Usando que

$$\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

calcule as seguintes integrais:

- a)  $\int \sin(3x) \sin(5x) dx$
- b)  $\int \sin(3x) \sin(7x) dx$
- c)  $\int \sin(nx) \sin(mx) dx$

**4** — Usando que

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} ((\cos(a+b) + \cos(a-b)))$$

calcule:

- a)  $\int \cos(x) \cos(5x) dx$
- b)  $\int_{\pi/4}^{\pi} \cos(x) \cos(7x) dx$
- c)  $\int \cos(nx) \cos(mx) dx$

**5** — Dados  $\alpha, \beta, m, n$  constantes, com  $\alpha \neq \beta$  mostre que existem  $A$  e  $B$  tais que:

$$\frac{mx+n}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta}.$$

$$\begin{aligned} a) & \int \frac{1}{(x+1)(x-1)} dx \\ b) & \int_7^9 \frac{x-1}{(x)(x-2)} dx \\ c) & \int \frac{x-1}{x^2-4} dx \\ d) & \int \frac{x-3}{x^2+3x+2} dx \end{aligned}$$

**7** — Seja  $\alpha \neq 0$ . Mostre que:

$$\int \frac{1}{\alpha^2+x^2} dx = \frac{1}{\alpha} \arctg\left(\frac{x}{\alpha}\right) + C$$

Use esse fato para calcular as integrais:

$$\begin{aligned} a) & \int \frac{1}{5+x^2} dx \\ b) & \int \frac{1}{3+4x^2} dx \\ c) & \int_0^1 \frac{3x+1}{5+x^2} dx \end{aligned}$$

**8** — Calcule as seguintes integrais:

- a)  $\int \sqrt{1+x^2} dx$
- b)  $\int \sqrt{1-4x^2} dx$
- c)  $\int \sqrt{1-\cos(x)} dx$
- d)  $\int \sqrt{3+4x^2} dx$
- e)  $\int \sqrt{x^2+2x+2} dx$

**9** — Calcule a área da elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ .

**10** — Prove que dados  $\alpha, m, n$  constantes mostre que existem  $A$  e  $B$  tais que:

$$\frac{mx+n}{(x-\alpha)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2}.$$

**11** — Calcule as seguintes integrais por frações parciais:

a)  $\int \frac{1}{x^2 - 9} dx$

b)  $\int \frac{x}{x^2 - 5x + 6} dx$

c)  $\int_3^4 \frac{x+3}{(x-1)^2} dx$

d)  $\int \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 2x + 1} dx$

e)  $\int \frac{x^2 + 2}{x^2 - 4} dx$

f)  $\int \frac{x+1}{x(x-2)(x+3)} dx$

g)  $\int \frac{x^4 + x + 1}{x^3 - x} dx$

Para calcular  $\int \sin^n(x) \cos^m(x) dx$  faça as seguintes transformações:

• Se  $n$  for ímpar faça  $u = \cos(x)$  observando que

$$\begin{aligned} & \int \sin^m(x) \cos^{2k+1}(x) dx \\ &= \int \sin^m(1 - \sin^2(x))^k \cos(x) dx \end{aligned}$$

Por fim faça a substituição  $u = \sin(x)$

• Se  $m$  for ímpar faça  $u = \sin(x)$

$$\begin{aligned} & \int \sin^{2k+1}(x) \cos^m(x) dx \\ &= \int \cos^m(1 - \cos^2(x))^k \sin(x) dx \end{aligned}$$

Por fim faça a substituição  $u = \cos(x)$

• Se  $n$  e  $m$  forem pares faça  $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$  e use as fórmulas de recorrência.

**12** — Calcule:

a)  $\int \sin(x) \sin(8x) dx$

b)  $\int \sin^3(x) dx$

c)  $\int \cos^2(4x) dx$

d)  $\int \sin(x) \cos^4(5x) dx$

e)  $\int \sin(2x) \cos^2(2x) dx$

f)  $\int_0^{\pi/4} \sin^2(2x) \cos^2(2x) dx$

g)  $\int_0^\pi \cos(x) \cos^2(4x) dx$

**13** — Calcule as integrais usando substituição trigonométrica. Esboce o triângulo retângulo associado

a)  $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} dx$

b)  $\int x^3 \sqrt{9 - x^2} dx$

c)  $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 9}} dx$

d)  $\int_0^{\frac{2}{3}} x^3 \sqrt{4 - 9x^2} dx$

e)  $\int x \sqrt{1 - x^4} dx$

f)  $\int \frac{dx}{(5 - 4x - x^2)^{\frac{5}{2}}}$

**Dicas** 8a)  $x = \operatorname{tg}(v)$  8b)  $x = \frac{1}{2} \operatorname{sen}(u)$  8c)  $\cos(x) =$

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

8d)  $x = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{tg}(u)$

8e) Observe que  $x^2 + 2x + 2 = 1 + (x + 1)^2$